



سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

عملیات مورد نیاز باغات

بادام

در فصول مختلف سال

اداره رسانه های آموزشی ، ترویجی
سال ۱۴۰۱



۲ - تکرار در برنامه تغذیه برگ‌گی درختان با کودهای حاوی کلسیم به صورت محلول پاشی.

۳ - محلول پاشی درختان با کودهای پتاسه نظیر سولو پتاس ؛ پس از برداشت میوه و طبق توصیه های فنی.

۴ - جمع آوری و معدوم نمودن بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام همزمان با برداشت محصول.

۵ - هرس و سر شاخه های آلوده به آفت سرشاخه خوار رزاسه و سر شاخه خوار هلو.



عنوان : عملیات مورد نیاز باغات بادام در فصول مختلف سال

گردآورنده: مهدی شفیعی حسن آبادی (کارشناس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان) - (کارشناس پیش آگاهی مدیریت حفظ نباتات استان) - معصومه احمدی خطیب (کارشناس حفظ نباتات شهرستان چادگان)

ویراستار ترویجی و ادبی: جمشید اسکندری - علی مصطفوی - مرتضی علی اکبر سیپانی
تهیه شده در: اداره رسانه های آموزشی و ترویجی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان اصفهان
ناشر: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

شمارگان: ۲۰۰۰

نوبت چاپ: اول

مسئولیت صحت مطالب با گردآورنده است

شماره ثبت در شورای انتشارات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به شماره ۱۰۱۳/۱۰۱۳-۲/۱۴۰۲ تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۴ است

نشانی: اصفهان - خیابان هزار جریب - سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان -
مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی - اداره رسانه های آموزشی و ترویجی
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۱۳۱۹۵

بهار

۱ - سمپاشی علیه بیماری لکه آجری بادام دو هفته پس از ریزش گلبرگ ها با سموم توصیه شده و در صورت وقوع بارندگی بهاره (سمپاشی های بعدی ۲ هفته بعد از نوبت پیشین).

۲ - سمپاشی علیه شته ها و برگ خوارها در صورت ضرورت.

۳ - هرس و معدوم نمودن سرشاخه های آلوده به آفات سرشاخه خوار هلو و سرشاخه خوار زردآلو که باعث پژمردگی جوانه های انتهایی می گردد و معدوم کردن شاخه های آلوده

۴ - محلول پاشی درختان با کودهای کلسیم.

تابستان

۱ - در صورت ضرورت، کنترل کنه تار عنکبوتی با مصرف کنه کش های اختصاصی.

زمستان

- ۱- اجرای عملیات هرس باغ متعاقب سپری شدن دوره سرما و قبل از زمان بیدار شدن درختان.
- ۲- مصرف کودهای های مورد نیاز درخت بر مبنای نتایج آزمون خاک و سن درختان به روش چالکود.
- ۳- روغن پاشی پیش بهاره درختان بر علیه آفات مکنده در مرحله قبل از تورم جوانه ها.
- ۴- اجرای برنامه تغذیه فروت ست پیش بهاره در زمان تورم جوانه ها.
- ۵ - محلول پاشی درختان با یکی از ترکیبات مسی در مرحله تورم جوانه ها.
- ۶- جمع آوری و معدوم نمودن بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام به صورت همگانی.
- ۷- اجرای عملیات پاکنی باغات با رعایت نکات فنی.
- ۸- اجرای شیوه صحیح آبیاری درختان به ویژه در روش آبیاری غرقابی (ایجاد سیستم نواری ، تشتکی دو طرفه و تشتکی یک طرفه در اراضی شیبدار) و اجتناب از تماس مستقیم آب با طوقه درختان و زیر خاک رفتن محل پیوندک.



پاییز

- ۱- اجرای برنامه تغذیه فروت ست پاییزه قبل از تغییر رنگ برگ ها و خزان آنها.
- ۲ - محلول پاشی با یکی از ترکیبات مسی پس از خزان برگ ها.
- ۳ - جمع آوری و معدوم نمودن بادام های آلوده به زنبور مغزخوار بادام بصورت همگانی.
- ۴- اجرای عملیات شخم و یخ آب پاییزه و زمستانه در صورت تامین آب.

بادام یکی از قدیمی ترین درختانی است که در کشور ایران کشت می شود. این محصول در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای که دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های ملایم است به خوبی رشد می کند. وسعت دامنه مناطق کشت بادام در ایران، نشان می دهد که بادام جزء گیاهانی است که دارای گستردگی اقلیمی بالایی بوده و گونه های اجدادی آن، ژن های مناسب و مطلوبی دارند. به طور کلی می توان گفت که بادام، بومی مناطق گرم و خشک آسیای غربی تا حوزه مدیترانه بوده و امروزه کشت آن در ایران، آمریکا، اسپانیا، مراکش، ایتالیا، پرتغال، ترکیه، یونان و استرالیا به طور وسیع معمول شده است.