

استانی بهداشتی



سازمان بهداشت کشور

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

بیماری لمپی اسکین



آموزش و ترویج

اداره کل دامپزشکی انسان (اصفهان)

بلوار کشاورز - شهرک امیریه

www.isfahan.vio.ir

۳۷۸۰۰۸۱۶-۱۸

سامانه ارتباطات مردمی: ۱۵۱۲

علایم بیماری

تب و افزایش بیش از اندازه دمای بدن و ایجاد ضایعات، بر جستگی بر روی پوست شبیه آله که متعاقباً تبدیل به تاول یا زخم می شود. آبریزش بینی و چشم، مشکلات تنفسی و بر جستگی های دکمه مانند بر روی پوست، کاهش شیر، سقط جنین در دام های بیمار دیده می شود.

دستورات پیشگیری

- منع جابجایی دام در مناطق درگیر و آلوده و همکاری تندگانگ دامداران با هماورین اداره کل دامپزشکی در راستای اعمال مقررات قرنطینه -آلودگی زدایی و ضد عفونی تجهیزات و وسائل مورد استفاده در دامداران
- کنترل پشه و مگس ها از طریق سمپاشی با سموم و حشره کش مناسب بنا به توصیه کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان
- انجام اقدامات بهداشتی در خصوص بهسازی محیط و جایگاه نگهداری دام
- در مناطق درگیر حسب تشخیص کارشناسان اداره کل، واکسیناسیون اعمال خواهد شد.
- جداسازی آبیشور دام های دارای علایم
- رعایت اصول و موازن اهمیت زیستی

علایم بیماری

بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی با اوگیری بالا در گاوان می باشد که با تب و بر جستگی های پوستی و ورم زیر پوست نهایان می شود. میزان مرگ و میر پایین می باشد. این بیماری يومی آفریقا بوده با این حال کزارشاتی از ابتلای دام هادر مصر، عراق، فلسطین، لبنان، عمان و ترکیه بوده است. متاسفانه طی سال گذشته مواردی از بیماری در غرب کشور مشاهده شده است.

حشره های پیشگیری

این بیماری باعث کاهش تولید شیر، سقط، تباروری، کاهش کیفیت پشم و آسیب پوستی می شود.

نماینده بیماری

تشخیص سریع بیماری بسیار مهم می باشد لذا دامداران در صورت مواجهه با تب و ضایعات پوستی در دام ها، هر اتاب را سریعاً به اطلاع نزدیکترین شبکه دامپزشکی شهرستان برسانند. جهت کنترل بیماری سهم پاشی جایگاه و بدن دام ها، ضد عفونی کردن وسایل و تجهیزات و نیز همکاری با اکیپ های واکسیناسیون دامپزشکی می باشد. مدت نظر باشد.

بیماری انسانی

این بیماری به انسان منتقل نشده و بنابراین جزو بیماری های مشترک بین انسان و دام محسوب نمی شود.

۱- انتقال عفونت

- ۱- قسمت اعظام انتقال عفونت توسط پشه ها و مگس صورت می پذیرد.
- ۲- پشه ها شامل پشه های خانگی و مگس، به طور بسیار گسترده با گاو های مبتلا مرطبه می باشند چنانچه موذی، حیوانات مهاجم و پرندگان وحشی نیز ممکن است به عنوان ناقلین ویروس عمل نمایند.
- ۳- تردد افراد و وسائل نقلیه
- ۴- تماس مستقیم دامهای حساس



۲- انتقال عفونت

- ۱- کنترل ورود و خروج دام زنده و علوقه معرفی
- ۲- ضد عفونی خودرو، و سایل و لوازم ورودی به دامداری
- ۳- سم پاشی و مبارزه با حشرات موذی مانند مگس و پشه
- ۴- عدم خرید و اضافه کردن دام بدون مجوز و از منابع نامشخص
- ۵- جداسازی و گرنظینه دام های مشکوک و گزارش سریع به دامپزشکی محل

